



## Malar

De två vanligaste arterna av malfjärilar som man hittar inomhus är klädesmal (klädmal) och pälsmal. Båda arterna är gula eller grå och har 12–14 mm mellan vingspetsarna.

En hona kan lägga upp till 100 ägg vilka kläcks efter några dagar. Utvecklingen från ägg till fullvuxen fjäril kan ta från en månad till närmare ett år, mycket beroende på omgivningens temperatur, den optimala temperaturen för utvecklingsprocessen är 25 °C. Klädesmalens larver lämnar sina kokonger medans pälsmalens larver behåller sina.

Fjärilarna gör ingen skada utan det är larverna som går till angrepp, främst mot textilier. Klädesmalens larver angriper i första hand material från djurriket men ibland även från växtriket. Syntetiska material angrips endast om de också innehåller fibrer från djurriket eller om de är smutsiga. Den är särskilt förtjust i fjädrar, hår och päls.

En favoritplats för larverna är textilier som inte används så ofta. Störst risk för mal finns annars i äldre textilier som kan vara inköpta

på second hand eller är arvegods. När larverna går till angrepp resulterar det i stora och oregelbundna hål. De lämnar också spinntrådar och spinnhylsor efter sig.

### Hur förebygger och åtgärdar man malangrepp?

Här följer några enkla åtgärder att ta till för att motverka angrepp:

- Tvätta alltid kläder och textilier innan förvaring och placera i tättslutande påsar
- Se till att dolda utrymmen t.ex. förråd och garderober dammsugs kontinuerligt
- Var uppmärksam på kläder och mattor som du inte regelbundet använder

**Om du önskar hjälp med sanering är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för tidsbokning.**